

SPOEDEISENDE HULP AAN SOFTENON SLACHTOFFERS

Sint Maartenskliniek Nijmegen

Bij spoedeisende hulp aan Softenon slachtoffers dient specifiek rekening gehouden te worden met onderstaande punten:

Intuberen voor beademing:

Dit kan anders zijn door anatomische afwijkingen in het KNO gebied (kaak, neus, vernauwde of afgesloten neusholten en verlamming van het zachte gehemelte). Ook kunnen er anatomische afwijkingen zijn in de halswervel kolom, waardoor extensie van de nek niet of minder ver mogelijk is. Bij verdenking op anatomische afwijkingen in het mond- en keelgebied dient laagdrempelig een anesthesioloog of een KNO arts te worden geconsulteerd.

Beademingskap:

Een beademingskap kan minder goed aansluiten door aangeboren afwijkingen aan de kaak en de neus. Monitor de zuurstofverzadiging in het bloed met een pulsoximeter en

consulteer laagdrempelig een anesthesioloog of een KNO arts.

Circulation

Cardiaal:

Er kan sprake zijn van cardiale afwijkingen, waaronder ritmestoornissen en aangeboren anatomische afwijkingen, hierdoor kan er sprake zijn van afwijkende harttonen. De pols is mogelijk niet palpabel, evenals pulsaties in de lies, door aangeboren afwijkingen aan het vaatbed.

Vaten:

Het vaatbed kan anders verlopen, vooral in de armen, waardoor een infuus in de arm moeilijker te plaatsen is. Er kunnen ook aangeboren afwijkingen zijn in het vaatbed van de benen, waardoor het aanbrengen van een infuus in de beenvaten kan worden beperkt. Bij spoed kan een intraossale toegang worden overwogen.

Ernstige bloedingen kunnen anders verlopen door aangeboren afwijkingen van het vaatbed

Bloeddruk:

De bloeddruk is niet altijd betrouwbaar te meten aan de armen en de benen.

Disability

Beoordeling neurologische uitval:

Er kunnen aangeboren afwijkingen aan de ogen zijn, waardoor de pupilreflex niet betrouwbaar is.

Door aangeboren afwijkingen aan de ledematen zijn bewegingen en lateralisatie niet altijd betrouwbaar. Door aangeboren afwijkingen van de ledematen en de perifere zenuwen zijn reflexen niet altijd betrouwbaar te testen.

Nekflexie kan beperkt en pijnlijk zijn.

Door afwijkingen aan de wervelkolom is nekstijfheid op neurologische basis niet altijd goed te beoordelen.

Veel Softenon slachtoffers zijn slechthorend, hiermee dient rekening te worden gehouden in de beoordeling.

SPOEDEISENDE HULP AAN SOFTENON SLACHTOFFERS

Sint Maartenskliniek Nijmegen

Infuus

Als bij een Softenon slachtoffer een infuus moet worden geprikt, zal er in eerste instantie in kaart worden gebracht of op de normale manier een toegang tot de vaten mogelijk is. Als het niet mogelijk is om in de armen te prikken, zal bepaald moeten worden of dit mogelijk is in de benen, in de voeten, de lies of in de hals. Als de bloedvaten niet zichtbaar zijn kan een echo apparaat gebruikt worden om het infuus in te brengen.

Aandachtspunten bij anesthesie

- Intubereren kan worden bemoeilijkt door anatomische afwijkingen in het KNO gebied (kaak, neus, vernauwde of afgesloten neusholten en verlamming van het zachte gehemelte). Ook kunnen er anatomische afwijkingen zijn in de halswervel kolom, waardoor extensie van de nek niet of minder ver mogelijk is. Dit wordt op de preoperatieve screening in kaart gebracht.

- Door het ontbreken van of afwijkingen aan de ledematen is verdeling van het lichaamsgewicht anders ten opzicht van normale lichaamsbouw; hiermee wordt rekening gehouden bij het bepalen van de dosis van de medicatie die gegeven wordt voor anesthesie.

Bloedafname

Het vaak atypische verloop van bloedvaten en de afwijkende anatomie bemoeilijkt bloedafname bij een Softenon slachtoffer voor een (operatieve) ingreep. Door de grote diversiteit aan afwijkingen zal per individu moeten worden gekeken naar de verschillende mogelijkheden.

Als bij een Softenon slachtoffer bloed moet worden afgenomen, zal er in eerste instantie in kaart worden gebracht of op de normale manier een toegang tot de vaten mogelijk is (arm stuwen en kijken en voelen naar geschikte aders). Als het niet mogelijk is om in de armen te prikken, zal bepaald

moeten worden of dit mogelijk is in de benen, in de voeten, de lies of in de hals. Als vaten moeilijk of niet zichtbaar zijn, kan een echo apparaat worden gebruikt om de vaten zichtbaar te maken en aan te prikken.

Aandachtspunten bij bloedafname

- Het Softenon slachtoffer kan het lichaamsdeel en plaats aangeven waar eerder bloed is afgenomen en uitleggen hoe dit toen gebeurde.

Meer medische informatie over (de gevolgen van) Softenon nodig?

Bel de Sint Maartenskliniek en vraag naar revalidatiearts mevr vd Wielen:

+31 24 3659776

Tijdens kantooruren bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag.

nesos | Stichting
Nederlandse
Softenon Slachtoffers

www.softenon.nl

Vul hieronder de naam en telefoonnummer van uw huisarts in:

.....